

NUOVI AVVISTAMENTI

Silvano TOSO

Istituto Nazionale Biologia selvaggina
Via Stradelli Guelfi, 23/A
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia.

Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc.. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione, l'esistenza di documentazione fotografica.

Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

MARANGONE MINORE, *Phalacrocorax pygmaeus*, un individuo avvistato il 17.6.1982 nell'Oasi Bosco di Palo, Ladispoli (Roma) (F. Fraticelli e C. Carere). Le osservazioni di questa specie, generalmente considerata di comparsa rara ed irregolare, si sono fatte più frequenti negli ultimi anni (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 4: 91).

NITTICORA, *Nycticorax nycticorax*, 14 individui (2 in abito adulto, 12 in abito del 2° anno) osservati il 10.1.1982 presso Torre d'Isola (Pavia) (M. Fasola) e un individuo osservato il 19.2.1981 presso la diga di Pamperduto sul fiume Ticino (Pavia) (F. Bovio). Lo svernamento di questa specie nella Valle Padana è da considerarsi ormai regolare anche se molto localizzato (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 5: 42).

AIRONE GUARDABUOI, *Bubulcus ibis*, un individuo avvistato il 10.2.1981 sul fiume Ticino presso Pavia (R. Bigi); un individuo osservato il 12 e il 14.12.1982 presso Zerbolò (Pavia) (L. Repetto). Specie di comparsa rara ed irregolare tranne che in Sicilia (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 5: 103).

AIRONE BIANCO MAGGIORE, *Egretta alba*, 2 individui osservati alla fine dell'ottobre 1980 sul lago di Burano (Grosseto) (T. Giacosa, fide G. Boano)

Questo airone, più frequente nella parte nord-orientale della penisola, è altrove di passo molto scarso e irregolare.

"ARDEIDE NERO", *Egretta garzetta* o *Egretta gularis*, un individuo osservato il 17 e 18.6.1981 nella Laguna di Ponente di Orbetello (Grosseto) (A. Bardi, A. Boano, L. Calchetti, E. Coppola). Le condizioni in cui sono state effettuate le osservazioni non hanno consentito l'accertamento dei caratteri distintivi tra le forme melaniche di *Egretta gularis gularis*, *Egretta gularis schistacea* ed *Egretta garzetta*. Le osservazioni note di ardeidi scuri in Italia sono le seguenti:

Garzetta melanica 20.5.76 Fiume Sesia (VC) Framarin f. 1977, Nos Oiseaux 34:31

Airone schistaceo 26.5.76 Foci Simeto (CT) Priolo A. 1976, Riv. Ital. Orn. 46

Garzetta con chiazze scure 13 e 14.5.76 Loc. La Selva (FR) Fraticelli (Com. Pers.)

Garzetta grigia uniforme 22.4.80 Saline Tarquinia (Roma) Pulcher-Gobbi (Com. pers.).

Garzetta grigia non uniforme 27.6.80 Crova (VC) Pulcher (Com. pers.).

AIRONE ROSSO, *Ardea purpurea*, un individuo il 7 e il 29.1.1982 in località Belgiardino, comune di Lodi (Milano) (G. Chiozzi, E. Pallotti). Questa specie è stata rinvenuta assai raramente nella Valle Padana durante la stagione invernale (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 5: 42).

MIGNATTAIO, *Plegadis falcinellus*, 5 individui osservati ripetutamente nei mesi di giugno e luglio 1981 in una garzaia della Lomellina (Pavia) (F. Barbieri, G. Bogliani, M. Fasola). La nidificazione del Mignattaio in questa località è possibile sebbene non accertata.

CICOGNA NERA, *Ciconia nigra*, un individuo osservato il 21.4.1981 a Demonte in Valle Stura (Cuneo) (R. Toffoli); 3 individui osservati il 17 settembre 1981 sul greto del Torrente Astico presso Montecchio Precalcino (Vicenza) (E. Cerato, G. Fracasso, G. Mezzalana). Questa specie è considerata di passo molto scarso anche se relativamente regolare.

OCA SELVATICA, *Anser anser*, un individuo avvistato dal 3 al 18.6.1982 nelle vicinanze di Boscoforte, Valli di Comacchio (Ferrara) (S. Volponi). La specie è data esclusivamente come di passo ed invernale.

CASARCA, *Tadorna ferruginea*, una femmina osservata il 27.6.1981 nell'alveo del Po di fronte a Polesella (Rovigo) (F. Barbieri, G. Bogliani). Individui erratici di questa specie compaiono occasionalmente provenienti dai Balcani (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 4:91).

PESCIAIOLA, *Mergus albellus*, due individui, femmine o giovani, osservati il 24.1.1981 nell'invaso presso la foce del fiume Conca, Cattolica (Forlì) (L. Casini, R. Santolini). Questa specie è di passo scarso ma relativamente regolare, nonchè localmente e parzialmente invernale.

FALCO PECCHIAIOLO, *Pernis apivorus*, 3 individui osservati il 9.3.1982 sulle pendici del monte Bolletto (Como) (S. Toso). Si tratta di una presenza eccezionalmente anticipata rispetto al normale periodo di migrazione primaverile di questa specie.

NIBBIO REALE, *Milvus milvus*, un individuo osservato il 21.12.1980 a Tronzano (Vercelli) (G. Boano, C. Pulcher). Avvistamenti di questa specie nell'Italia settentrionale sono ormai assai poco frequenti in qualsiasi stagione.

POLLO SULTANO, *Porphyrrio porphyrio*, un individuo adulto, apparentemente appartenente alla forma nominale, avvistato il 1.5.1982 nell'Oasi di "Punte Alberete" lungo il fiume Lamone (Ravenna) (S. Volponi). Al di fuori dell'areale sardo il Pollo sultano è da considerarsi erratico ed occasionalmente estivante.

VOLTAPIETRE, *Arenaria interpres*, 4 individui adulti in abito e un immaturo osservati il 3 e 4.5.1981 lungo il Po a Carmagnola (Torino) (G. Boano). La specie è di passo scarso ma abbastanza regolare lungo le coste, assai più rara all'interno.

RONDINE DI MARE MAGGIORE, *Hydroprogne tschegrava*, un individuo osservato il 27.6.1981 sul Po a Ficarolo (Rovigo) (F. Barbieri, G. Bogliani). Questa sterna è localmente e sporadicamente estivante (vedi anche questa rubrica, *Avocetta* 4: 92).

RONDONE, *Apus apus*, un individuo avvistato il 13.12.1981 sulla spiaggia del Lido di Volano (Ferrara) (R. Zarrelli). Le osservazioni di questa specie nel periodo invernale sono eccezionali almeno per l'Italia sett

CANNAIOLA, *Acrocephalus scirpaceus*, un individuo osservato il 31.12.1981 nell'Oasi di Orbetello (Grosseto) (D. Martelli). Sporadici casi di svernamento di questa specie erano sinora noti solo per la Sicilia.

CANNARECCIONE, *Acrocephalus arundinaceus*, un individuo giovane dell'anno (inannellato nel nido l' 8.6) è stato osservato sino al 15.11.1981 al lago di Fimon (Vicenza) (G. Fracasso). Si tratta di una presenza eccezionalmente tardiva di questa specie esclusivamente estiva.

CINCIA DAL CIUFFO, *Parus cristatus*, un individuo osservato il 15.10.1981 in località Valfredda del comune di Carrosio (Alessandria) (S. Spanò). Nella stessa zona nel territorio di Mornese è stato accertato un caso di nidificazione (estate 1981) (C. Ferrari, F. Silvano fide S. Spanò). Le osservazioni testimoniano probabilmente una espansione dell'areale della specie lungo l'Appennino settentrionale dal settore occidentale a quello orientale (vedi anche Maranini, A. Atti del I° Convegno Italiano di Ornitologia, Aulla, 1981).

ERRATA CORRIGE

Nuovi Avvistamenti, *Avocetta* 5 (1981)

p. 105: Errata: CUTRETTOLA CAPINERA, *Motacilla flava feldeggi*, 1 individuo osservato

Corrige: CUTRETTOLA, una cutrettola capinera a sopracciglio giallo osservata