

Rubriche

Questa sezione di Avocetta ospita resoconti e comunicazioni ufficiali delle attività del CISO, report della Commissione Ornitologica Italiana, aggiornamenti relativi allo stato dell'avifauna italiana, forum, recensioni, news ed altre comunicazioni non sottoposte a referaggio. I lettori che volessero proporre nuove rubriche sono invitati a contattare la Redazione.

Il fine ultimo delle rubriche è favorire lo scambio di informazioni tra il CISO e i soci, con particolare riferimento alle iniziative promosse dall'Associazione.

Commissione Ornitologica Italiana (COI) – Report 19

A cura di *Pierandrea Brichetti*¹ e *Daniele Occhiato*²

Nel 2001 il Comitato di Omologazione Italiano è divenuto un gruppo di lavoro del Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), si è dotato di nuove norme interne ed ha ampliato i propri campi di interesse, trasformandosi in Commissione Ornitologica Italiana con i seguenti compiti: 1) esaminare le segnalazioni di specie accidentali segnalate meno di 11 volte in Italia; 2) esaminare le prime nidificazioni per l'Italia e quelle non più riscontrate dopo il 1949; 3) redigere e aggiornare periodicamente una lista nazionale degli uccelli italiani in accordo con lo standard europeo proposto dall'AERC, come indicato di seguito:

- Categoria A - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta dall'1.1.1950;
- Categoria B - specie di origine apparentemente selvatica osservata almeno una volta tra il 1800 e il 1949;
- Categoria C - specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha costituito una popolazione nidificante autosufficiente, come pure gli uccelli che provengono da questo tipo di popolazione;
- Categoria D - specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa, oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria;
- Categoria E - specie sfuggita alla cattività.

Composizione

L'organico della Commissione è composto da un numero di persone compreso tra dieci e venti. La composizione dei membri della Commissione cerca

di soddisfare criteri di competenza ornitologica, di rappresentanza geografica e di rappresentanza delle redazioni delle riviste ornitologiche italiane.

La Commissione stessa propone nuovi membri e chiede o riceve le dimissioni di quelli in carica. Ogni modifica viene sottoposta al giudizio del Comitato Scientifico del CISO.

Non viene fissato un limite massimo di permanenza nella Commissione. Si auspica però un ricambio dei membri, compatibilmente con la reale offerta di altre persone qualificate e disponibili nel panorama ornitologico italiano. L'organico attuale è stato approvato dal Comitato Scientifico del CISO. L'unica carica prevista all'interno della COI è quella di segretario. Il numero di segretari può variare a seconda delle esigenze.

La Commissione risulta attualmente composta dai seguenti membri: E. Arcamone, N. Baccetti, P. Brichetti (Segreteria), G. Fracasso, F. Fraticelli, O. Jani, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, A. Micheli, O. Niederfriniger, S. Nissardi, D. Occhiato (Segreteria), A. Ortali, M. Passarella, L. Serra e C. Violani.

Presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere sottoposte al giudizio della Commissione utilizzando tassativamente l'apposita scheda compilata con un word processor (MsWord o compatibile, in formato .doc o .rtf, ma non .pdf). Le osservazioni che non pervengono su tali schede verranno sospese e verrà richiesto agli

osservatori di compilare il modello che potranno scaricare da questo sito www.ciso-coi.org. Le segnalazioni vanno inviate esclusivamente a:

Daniele Occhiato, Via dell'Argingrosso 139/7B, 50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

I resoconti dell'attività della COI sono attualmente pubblicati su *Avocetta*, periodico del CISO, e sul suo sito web (www.ciso-coi.org).

Metodi di giudizio

Il materiale di ciascuna segnalazione viene inviato a tutti i membri della Commissione, i quali possono inviare commenti ed osservazioni. A cinque membri viene richiesto di compilare in maniera indipendente un'apposita scheda di giudizio, che deve essere inviata alla segreteria prima della riunione e che rimarrà agli atti. La scelta di queste persone è fatta in base alle competenze specifiche. Senza i cinque giudizi scritti la segnalazione non può essere valutata in occasione della riunione. Il giudizio finale sulla segnalazione viene raggiunto in tale sede per votazione. Per accettare una segnalazione non devono esserci più di due voti contrari.

Per l'accettazione di una specie nuova per l'avifauna italiana viene richiesta una documentazione fotografica che permetta la determinazione specifica del soggetto e l'individuazione della località, come per esempio la presenza di elementi del paesaggio caratterizzanti.

Per soggetti trovati morti o abbattuti devono essere rese disponibili le spoglie. Non si accetta di esaminare esemplari già preparati se non provenienti da collezioni storiche di provata attendibilità scientifica. In assenza degli elementi richiesti le segnalazioni vengono sospese.

Per verificare il numero di segnalazioni attualmente noto per l'Italia si consiglia di fare riferimento alla "Check-List degli uccelli italiani" di Brichetti e Massa (*Riv. ital. Orn.* 1998, 68:129-152) o di consultare la lista inserita nel sito web del CISO.

Si raccomanda di allegare alle segnalazioni possibilmente stampe a colori o duplicati di diapositive, in modo che possano essere esaminati e conservati nell'archivio COI.

Nuove liste COI

Lista 1 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine selvatica certa)

Lista 1A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile. - Specie determinabili con certezza in base ad almeno uno dei seguenti elementi: specie inconfondibili dal punto di vista morfologico; specie di non facile identificazione osservate a distanza molto ravvicinata per un adeguato lasso di tempo; conferma della determinazione da parte di altri osservatori che hanno formulato segnalazioni indipendenti; supporto documentario (es. fotografia, filmato) da cui si possano anche riconoscere particolari dell'ambiente o del paesaggio; esemplari catturati per inanellamento scientifico; esemplari trovati morti o cacciati di cui sia disponibile il corpo o parti di esso; soggetti debilitati recapitati a centri di recupero ufficialmente riconosciuti e operanti con rigore scientifico.

Lista 1B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione. - Segnalazioni supportate da descrizione concisa ma essenziale, fatte per un breve lasso di tempo e/o a distanza critica; il supporto documentario può mancare o essere di scarsa qualità. Esperienza e affidabilità dell'osservatore sono elementi di cui si tiene sempre conto.

Lista 1C: accettate solo a livello generico. - Sono accettate a livello indeterminato, sulla base di una documentazione completa ma non sufficiente per il riconoscimento specifico certo. Si tratta di segnalazioni riguardanti specie che sono particolarmente difficili da separare da altre simili. Le segnalazioni che ricadono in quest'ultima lista possono essere riviste successivamente, sia alla luce di nuove conoscenze che in base al quadro fenologico evidenziato.

Lista 2 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine selvatica dubbia) in attesa di disporre di un inquadramento delle specie più generale

Si tratta di specie correttamente determinate per le quali esistono dubbi sulla reale provenienza selvatica. Queste segnalazioni possono essere momentaneamente accantonate in attesa di poter disporre di un numero sufficiente a delinearne il pattern di distribuzione, oppure di verificare eventuali modifi-

cazioni dello status fenologico della specie a livello europeo e/o mediterraneo, o di raccogliere ulteriori informazioni. La lista è quindi aperta e la valutazione complessiva potrà fornire elementi utili anche per l'attribuzione specifica della Categoria AERC.

Lista 2A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile.

Lista 2B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 2C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).

Lista 3 - segnalazioni convalidate (soggetti di origine domestica certa)

Riguardano soggetti correttamente determinati per i quali esiste la certezza o un'elevatissima probabilità che siano sfuggiti alla cattività.

Lista 3A: accettate sulla base di una documentazione completa e inequivocabile.

Lista 3B: accettate sulla base di una documentazione sufficiente a permettere la corretta determinazione.

Lista 3C: accettate solo a livello generico (da menzionare nel report ed eventualmente da riprendere in considerazione).

Lista 4 - segnalazioni sospese per ulteriori approfondimenti

Si tratta di segnalazioni particolarmente problematiche, in genere riguardanti soggetti di origine selvatica certa, per le quali si ritiene opportuno sospendere il parere in attesa di ulteriori sviluppi.

Lista 4A: sospesa in attesa di ottenere il parere qualificato di specialisti (italiani o stranieri) o di ulteriori approfondimenti da richiedere all'AERC.

Lista 4B: sospesa in attesa di ulteriore documentazione da richiedere al segnalatore.

Lista 4C: sospesa in attesa di eventuali sviluppi futuri (per esempio in previsione di altre segnalazioni).

Lista 5 - segnalazioni non convalidate

Si tratta di specie non accettate per almeno uno dei seguenti motivi: determinazione inesatta; documentazione scarsa o insufficiente per escludere specie simili; esemplare rinvenuto già preparato (con l'eccezione dei risultati di studi su collezioni storiche); documentazione contrastante con le dichiarazioni del segnalatore.

I report della COI, inizialmente apparsi sulla Rivista italiana di Ornitologia, vengono ora pubblicati su Avocetta, periodico del CISO. L'elenco dei resoconti pubblicati è il seguente:

Riv. ital. Orn.: (1) 1982, 52: 205-206; (2) 1983, 53: 194-195; (3) 1985, 55: 186-187; (4) 1986, 56: 245-246; (5) 1987, 57: 243-246; (6) 1989, 59: 269-272; (7) 1992, 62: 41-43; (8) 1993, 63: 193-198; (9) 1995, 65: 63-68; (10) 1995, 65: 147-149; (11) 1996, 66: 171-174; (12) 1997, 67: 189-192; (13) 1998, 68: 205-208; (14) 1999, 69: 211-214.

Avocetta: (15) 2002, 26: 117-121; (16) 2003, 27: 207-210; (17) 2004, 28: 41-44; (18) 2004 28: 97-102.

Segnalazioni

La Commissione Ornitologica Italiana si è riunita il 10 novembre 2005 presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Erano presenti: N. Baccetti, G. Boano, P. Bricchetti (Segreteria), G. Fracasso, K. Kravos, S. Laurenti, A. Magnani, D. Occhiato (Segreteria), A. Micheli, M. Passarella, S. Nissardi, O. Niederfriniger, L. Serra. Assenti giustificati: E. Arcamone, F. Fraticelli, C. Violani.

Segnalazioni omologate (Lista COI IA)

Corriere di Leschenault *Charadrius leschenaultii*
1 ind. fotografato, 25.06.2005, Portoviro (RO), rivisto il 26 e 27. Segnal. Franco Trave.

Documentazione sufficiente ed inequivocabile.
2^a segnalazione italiana.

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla*

1 ad. inanellato, 20.11.2004, Porto di Sanremo (IM). Segnal. Alessio Chiusi.

Documentazione completa ed inequivocabile.

2^a segnalazione italiana, in quanto si tratta di un nuovo caso di svernamento dello stesso soggetto segnalato in precedenza (cfr. Report 18).

Gabbiano di Sabine *Larus sabini*

1 ad., 17.05.2005, Pescate (LC), Segnal. Stefano Riva.
Documentazione completa ed inequivocabile.
5^a segnalazione italiana.

Occhiocotto di Cipro *Sylvia melanothorax*

1 maschio ad. catturato e inanellato, 12.05.2004,
Ventotene. Segnal. Fernando Spina.
Documentazione scarsa ma inequivocabile.
1^a segnalazione italiana.

Lui di Pallas *Phylloscopus proregulus*

1 ind. catturato e inanellato, 16.04.2003, Capri.
Segnal. Dario Piacentini.
Documentazione scarsa ma inequivocabile.
7^a segnalazione italiana.

Averla meridionale *Lanius meridionalis*

1 ind., Altopiano del Beinale, Carrù (CN),
30.11.2003-13.03.2004. Segnal. Bruno Caula.
Documentazione completa ed inequivocabile.
2^a segnalazione italiana (1^a segnalazione della ssp.
nominale).

Viene omologata come prima segnalazione italiana in
attesa di una completa rivalutazione delle numerose
segnalazioni riguardanti la specie e mai sottoposte alla
COI poiché solo recentemente separata dalla simile
Averla maggiore settentrionale *Lanius excubitor*.

Averla isabellina *Lanius isabellinus*

1 ind. primo inverno, 26.11.2004, Marina di Torre
del Lago, Viareggio (LU). Segnal. L. Pardini, A.
Quaglierini, M. Trotta.
Documentazione completa ed inequivocabile.
9^a segnalazione italiana.

Corvo *Corvus frugilegus*

Tentativo di nidificazione di una coppia in loc.
Canale Biancolino, Due Carrare (PD) nell'aprile-
maggio 2003. Segnal. Aldo Tonelli; altri osservatori
Stefano Bottazzo. La scheda non contiene ulteriori
informazioni e rimanda alla nota presentata al 4^o
Convegno Faunisti Veneti, attualmente in corso di
stampa. In sintesi: il 1^o aprile notato un individuo
presso un nido di Corvide costruito sulla sommità di
una robinia; il 2 aprile osservata la coppia al nido,
con maschio in atteggiamenti territoriali e la femmi-
na intenda a sistemare rami nel nido; dal 2 al 19 apr-
ile notata femmina in cova e maschio nelle vicinan-
ze. Ultimo contatto il 31 maggio, con osservazione
di due individui, di cui uno adulto.

Segnalazione omologata come prima nidificazione
con esito ignoto.

Segnalazioni omologate (Lista COI 1B)

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla*

1 ad. e 1 ind. primo anno, 08.04.2004, Principina a
Mare e Bocca d'Ombrone (GR). Segnal. Lorenzo
Vanni.
Segnalazione omologata per documentazione suffi-
ciente.
3^a segnalazione italiana.

Codazzurro *Tarsiger cyanurus*

1 maschio adulto, 26.12.2001-1.2.2002. Frazione
Verzellino, Ronco Biellese (BI), Segnal. L. Maula,
L. Bordignon.
Segnalazione omologata per documentazione suffi-
ciente.
Segnalazione sospesa durante la seduta COI 16 e
rivalutata alla luce della nuova segnalazione inver-
nale piemontese.
5^a segnalazione italiana.

Codazzurro *Tarsiger cyanurus*

1 femmina, 22.01.2005, Fiume Tanaro, Alba (CN).
Segnal. Sergio Fasano.
Segnalazione omologata per documentazione suffi-
ciente.
6^a segnalazione italiana.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 2A)

Oca di Ross *Anser rossii*

2 ind., 29.01.2005, ARE ex zuccherificio di Cre-
valcore (BO). Segnal. Giorgio Leoni *et al.*
Segnalazione accettata sulla base di una documenta-
zione completa ed inequivocabile, ma individui di
origine selvatica dubbia.
Nessuna osservazione italiana ritenuta valida.

Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus*

1 ind., 16.07.2005, Lago di Alviano (TR). Segnal.
Stefano Laurenti.
Segnalazione accettata sulla base di una documenta-
zione completa ed inequivocabile, ma individuo di
origine selvatica dubbia.
4 precedenti segnalazioni ritenute valide.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 3A)**Astrilde guancearancio *Estrilda melpoda***

1 ind., Palude Brabbia (VA), 22.09.2004. Segnal. Chiara Scandolara.

Documentazione completa ed inequivocabile ma individuo ritenuto di origine domestica certa. Nessuna osservazione italiana ritenuta valida.

Pyrrhula (p.) cineracea

1 m., novembre 2001, Pontedilegno (BS). Segnal. Pierandrea Bricchetti.

Documentazione completa ed inequivocabile ma individuo ritenuto di origine domestica certa. Nessuna osservazione italiana ritenuta valida.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 3B)**Alzavola beccorosso *Anas erythrorhyncha***

1 ind., 16.07.2005, Lago di Alviano (TR). Segnal. Stefano Laurenti.

Documentazione sufficiente ma individuo ritenuto di origine domestica certa. Nessuna osservazione italiana ritenuta valida.

Segnalazioni non omologate (Lista COI 3C)***Cathartes aura***

1 ad., 26.08.2000, Fiume Po, Caorso (PC). Segnal. Angelo Battaglia.

Individuo ritenuto di origine domestica certa, attribuito dal segnalatore a *Cathartes aura*; Segnalazione accettata solo a livello generico.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4A)***Locustella fluviatile Locustella fluviatilis***

1 ad. catturato e inanellato, 18.08.2004, San Genuario, Fontanetto Po (VC). Segnal. S. Fasano, M. Pavia, C. Gertosio.

Segnalazione sospesa in attesa di richiedere ulteriori pareri di esperti esterni.

Una precedente segnalazione ritenuta valida.

Segnalazioni sospese (Lista COI 4B)**Airone schistaceo *Egretta gularis***

Tentativo di nidificazione di una coppia mista *E. gularis* x *E. garzetta*, Valli di Mortizzuolo, Mirando-

la (MO), 12.05.2003. Individuo successivamente osservato e filmato in cova. Segnal. C. Giannella, R. Gemmato e M. Marangoni. Segnalazione sospesa in attesa di richiedere ulteriore documentazione (video) ai segnalatori.

Ardeidae sp.

1 ind., 15.05 e 25.05.2005, Oasi di San Giuliano, Matera. Segnal. V.G. Santantonio.

Segnalazione sospesa in attesa di richiedere ulteriore documentazione (video) al segnalatore.

Italian Ornithological Commission (Italian Rarities Committee) - Report 19

The following species were accepted for Italy (Cat. AERC: A - List 1A, 1B): Charadrius leschenaultii (Venetia 2005), Larus atricilla (Liguria 2004, Tuscany 2004), Larus sabini (Lombardy 2005), Sylvia melanothorax (Ventotene Is., Latium 2004; first record for Italy), Phylloscopus proregulus (Capri Is., Campania 2003), Tarsiger cyanurus (Piedmont winter 2001-02-previously suspended, Piedmont 2005), Lanius meridionalis (Piedmont 2004), Lanius isabellinus (Tuscany 2004), Corvus frugilegus (Venetia, breeding attempt 2003).

The following ones were not accepted (Cat. AERC: D, E - List 3A, 3B, 3C): Anser rossii (Emilia-Romagna 2005), Anas erythrorhyncha (Umbria 2005), Cathartes aura (Emilia-Romagna 2000), Hoplopterus spinosus (Umbria 2005). Estrilda melpoda (Lombardy 2004), Pyrrhula (p.) cineracea (Lombardy 2001)

The following ones were suspended (List 4A, 4B): Ardeidae sp. (Apulia 2005), Egretta gularis (breeding attempt mixed pairs with E. garzetta), Locustella fluviatilis (Piedmont 2004).

¹CISO, Via V. Veneto 30, I-25029 Verolavecchia (BS) (pbrichetti@alice.it); ² Via dell'Argingrosso 139/7B, I-50142 Firenze (danocc@tiscali.it)

Resoconto Ornitologico Italiano – Anno 2004

A cura di *Ugo Mellone*¹, *Maurizio Sighele*² ed *Emiliano Arcamone*³

Da questo numero prende avvio la nuova rubrica Resoconto Ornitologico Italiano (R.O.I.). Il nome vuol testimoniare la volontà del C.I.S.O. di dare un maggiore impulso ed un più ampio respiro a questo settore delle rubriche di Avocetta. L'impegno redazionale, forse un po' ambizioso, è quello di convogliare nel R.O.I. il risultato delle attività di avvistamento svolte in Italia da osservatori operanti singolarmente o nell'ambito delle numerose associazioni regionali e locali. Un nuovo aspetto è rappresentato dalla collaborazione fornita dall'associazione EBN Italia, che ha favorito la raccolta di numerose osservazioni effettuate da *birdwatchers* italiani in tutte le regioni.

Proseguendo uno storico filone, seguito per anni dalla rubrica "Nuovi Avvistamenti", il R.O.I. vuole fornire l'elenco degli avvistamenti di uccelli rari avvenuti annualmente nel nostro paese; come per la precedente rubrica vengono anche segnalati tutti gli avvistamenti riguardanti specie rare in certi periodi dell'anno oppure presenti in quantità inusuale nel nostro paese. Tra parentesi viene inserito il nome della persona che ha effettuato l'osservazione; quando questo compare a fianco di una sigla vuol dire che l'avvistamento è inserito in una rubrica o in un archivio di un'associazione oppure, nel caso di EBN, è stato comunicato a tale mailing-list. Per quanto concerne le segnalazioni valutate dalla Commissione Ornitologica Italiana, si rimanda alle apposite rubriche, regolarmente pubblicate su Avocetta. Questa rubrica va quindi interpretata come importante complemento ai report della C.O.I.. Invitiamo quindi tutti i singoli ornitologi, gruppi ornitologici e associazioni di *birdwatching* a collaborare a questa nostra rubrica, nella speranza che questo sforzo di rendere organiche le conoscenze sulle specie più rare possa contribuire anche a favorire i rapporti e gli scambi di informazioni tra le diverse parti del mondo ornitologico italiano, e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo resoconto, fornendo utili informazioni o precisazioni.

Elenco delle abbreviazioni:

Alula = Rivista Alula; AsFaVe = Associazione Faunisti Veneti; Boll. ROL = Bollettino Rete Osservato-

ri Liguri; COT = Centro Ornitologico Toscano; EBN = EBN Italia

Oca lombardella minore *Anser erythropus* - 1 ind., 23/2-12/3/04, Isola della Cona (GO) [S. Candotto *et al.*, EBN] - 1 ind., 25/2/2004, Terranova (GO) [E. Benussi, EBN].

Oca facciabianca *Branta leucopsis* - 1 ind., 19/2-8/03/2004, Isola della Cona (GO) [S. Candotto *et al.*, EBN].

Casarca *Tadorna ferruginea* - 1 ind., 6-9/6/04, Frattarolo (FG) [M. Marrese *et al.*, EBN].

Anatra marmorizzata *Marmaronetta augustirostris* - 1 ind., 3/1-6/2/04, Gorgi Tondi/Pantano Leone (TP) [M. Marchese, A. Ciaccio, EBN] - 5 ind., 13/4/04, Pantano Leone (TP) [A. Ciaccio, EBN] - 5 ind. il 27/8/04 e 10 ind. il 10/9/04, Gorgi Tondi (TP) [M. Marchese, A. Roccella, EBN] - 1 ind., 31/10/04, Pantano Leone (TP) [A. Ciaccio, EBN].

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* - 148 ind., 28/1/04, Simeto-Lentini (CT) [A. Corso *et al.*, EBN] - 40 ind., 7/3/04, Macchiatonda (RM) [R. Gildi, EBN] - 130 ind., 30/10/2004, Lentini, (CT) [A. Corso *et al.*, EBN].

Importanti concentrazioni.

Moretta codona *Clangula hyemalis* - 1 ind., 16-18/1/04, Viareggio (LU) [D. Occhiato, COT; D. Verducci, EBN] - 1 ind., 12/12/04, Marano (UD) [F. Trave, EBN].

Orchetto marino *Melanitta nigra* - 105 ind., 29/10/04, Pescara [A. Antonucci, EBN].

Importante concentrazione.

Pesciaiola *Mergus albellus* - 1 ind., 1/2/04, Frattarolo (FG) [A. Corasaniti *et al.*, EBN].
Svernante raro in Italia meridionale.

Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala* - 1 ind., 13/1-14/2/04, Albarella (RO) [L. Gramolelli *et al.*, EBN] - 1 ind., 2/3/04, Cà Pisani (RO) [P. Ronconi, EBN].

Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus* - 1 ind., 19/3/04, Lago di Mezzola (SO) [P. Bonvicini, EBN].

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis* - 1 ind., 7/2/04, Malcesine (VR) [M. Pedrelli, A. Calzi, EBN].

Osservazione fuori areale.

Marangone minore *Phalacrocorax pygmaeus* - 4 ind., 1/3/04, Ugento (LE) [G. Tortorella, EBN].
Svernante raro al di fuori dell'alto Adriatico.

Airone rosso *Ardea purpurea* - 1 ind., 21/1/04, Lago di Burano [F. Cianchi, COT] - 1 ind., 17/1/04, Is Cortilaris (OR) [W. Piras, EBN].
Svernante raro.

Airone schistaceo *Egretta gularis* - 1 ind., 3/1-11/1/04, Punta Barene (GO) [P. Vacilotto *et al.*, EBN] - 1 ind., 18/2/04, Foce del Timavo (GO) [I. Zanutto, J. Casadio, EBN] - 1 ind., 13/5/04, Tronzano (VC) [F. Boggiani, EBN] - 1 ind., 12/6/04, Ortazzo (RA) [L. Casini, EBN] - 1 ind., 13/8/04, Ortazzo (RA) [M. Scaffidi, EBN] - 1 ind., 30/12/04, Ortazzo (RA) [S. Sava, EBN].

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* - 1 ind., 7/11-7/12/04, Maccarese (RM) [C. Catoni *et al.*, EBN].
Osservazione in periodo inusuale.

Tarabusino *Ixobrychus minutus* - 1 ind., 22/2/04, Casale sul Sile (TV) [P. Vacilotto, EBN] - 1 ind., 10/12/04, Frassino (VR) [R. Lerco, EBN].
Osservazioni in periodo inusuale.

Cicogna nera *Ciconia nigra* - 1 ind., 9/1/04, La Costanza (PI) [G. Bedini, COT] 1 ind., 19/1/04, Veverri (NO) [C. De Matteo Graziano, EBN] - 1 ind., 8-29/2/04, Casoni Borroni (PV) [E. Bezzone, EBN] - 1 ind., 27/2/04, Diga Basentello (BA) [P. Giglio, EBN] - 1 ind., 9-13/11/04, Valle Vecchia di Caorle (VE) [F. Piccolo, EBN] - 1 ind., 22/11/04, Navacchio (PI) [L. Vanni, EBN] - 1 ind. (deilitato), 22/11/04, Castello di Brussa, Caorle (VE) [L. Panzarin, AsFaVe] - 1 ind., 7/12/2004, Frescarolo (PR) [C. Fracaso, EBN] - 1 ind., 8/12/04, Maccarese (RM) [S. Allavena, Alula].
Svernante raro.

Mignattaio *Plegadis falcinellus* - 1 ind., 3/1/04, Gavorrano (GR) [L. Becherucci, EBN] - 1 ind., 11/1/04, Pantano Leone (TP) [M. Marchese, EBN] - 6 ind., 11/1/04, Foce del Simeto (CT) [G. La Grua *et al.*, EBN] - 5 ind., 17/1/04, Risaie di Principina (GR) [E. Arcamone *et al.*, COT] 1 ind., 18-20/1/04, Frattarolo (FG) [M. Marrese, G. Nuovo, EBN] 5 ind., 14/11/04, Fucecchio (LU-PI) [M. Taddei, EBN].
Svernante raro.

Fenicottero *Phoenicopterus roseus* - 26 ind., 3/5/2004, Savigliano (CN) [P. Beraudo, EBN] - 1 ind., 19/10-18/11/04, Bentivoglio (BO) [L. Golinucci, D. Bonazzi, EBN] - 1 ind., 29/12/04, Frescarolo (PR) [A. Calzi *et al.*, EBN].
Osservazioni in località inusuali per la specie.

Nibbio bruno *Milvus migrans* - 1 ind., 9/1/2004, Roma [M. Trotta, Alula] - 1 ind., 25/11/04, Po di Tolle (RO) [D. Trombin, AsFaVe].
Svernante raro nell'Italia continentale.

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla* - 1 ind., 21/1/04, Lago di Burano (GR) [F. Cianchi, COT] - 1 ind., 16-17/1/04, Oldenico (VC) [I. Manfredo *et al.*, EBN] - 1 ind., 8/2/04, Orbetello (GR) [R. Guidoni, EBN; D. Occhiato, COT] - 1 ind., 20/11/04, Carmagnola (TO) [G. Boano *et al.*, EBN] - 1 ind., 30/12/04, Circeo (LT) [M. Panuccio, EBN].

Capovaccaio *Neophron percnopterus* - 21/3/04, 2 ind., Torre in Pietra (RM) [F. Petretti, EBN] - 1 ind., 24/4/04, La Costanza (PI) [A. Fontanelli, COT] - 1-5/6/04, 1 ind., Forgaria (UD) [F. Genero *et al.*, EBN] - 19/10/04, 1 ind., Casse di Espansione Secchia (MO) [G. Ronchetti, EBN].
Osservazioni al di fuori dell'areale attuale.

Avvoltoio monaco *Aegypius monachus* - 1 ind., 31/3/04, Valle Stura (CN) [F. Bergese, EBN] - 1 ind., 15/11/04, Montalto (VT) [S. Celletti, EBN].
L'individuo della Valle Stura proveniva dalla Francia, dove era stato rilasciato nell'ambito di un progetto di reintroduzione, ed è stato recuperato stremato a Palermo il 6/12/04 [G. Ceccolini, EBN]. Un altro individuo della stessa provenienza è stato osservato alle Capanne di Marcarolo (AL) il 28/11/04, dove è stato recuperato debilitato l'1/12/04 [W. Campora, EBN].

Biancone *Circaetus gallicus* - 1 ind., 22/12/04, Macchia Lucchese (LU) [G. Motta *et al.*, EBN].
Svernante irregolare.

Albanella pallida *Circus macrourus* - 1 ind., 29/8/04, Marettimo (TP) [G. e P. Chiatante] - 1 ind., 2/9/04, Colli Asolani (TV) [G. Silveri *et al.*, EBN] - 1 ind., 4/9/04, Marettimo (TP) [F. Mastopasqua *et al.*] - 1 ind., 8/9/04, Panarea (ME) [N. Agostini] - 1 ind., 10/9/04, Aspromonte (RC) [M. Panuccio] - 1 ind., 19/10/04, Capo Miseno (NA) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 27/12/04, Vendicari (SR) [A. Corso *et al.*, EBN]. Specie rara al di fuori del periodo primaverile, occasionale in inverno.

Albanella minore *Circus pygargus* - 1 ind., 27/12/04, Cuba (SR) [A. Corso *et al.*, EBN]. Osservazione in periodo inusuale.

Poiana codabianca *Buteo rufinus* - 1 ind., 1/5/04, Concordia Sagittaria (VE) [A. Nardo, EBN] - 1 ind., 17/8/2004, Monte Gorzano (TE) [S. Di Carlo, EBN] - 1 ind., 23-28/8/04, Sacca di Scardovari (RO) [A. Tonelli, *et al.*, EBN] - 1 ind., 26/8/04, Aspromonte (RC) [M. Panuccio] - 1 ind., 29/8/04, Valle Stura (CN) [B. Caula, EBN] - 1 ind., 16/10/04, Arrone (RM), [S. Di Carlo, EBN] - 1 ind., 19/10/04, Sacca di Scardovari (RO) [E. Verza, EBN] - 1 ind., 21/11/04, Saline di Brindisi (BR) [A. Corasaniti, G. Nuovo, EBN] - 1 ind., 27/12/04, Vendicari (SR) [A. Corso *et al.*, EBN]. La specie risulta regolare solo durante il periodo primaverile nelle regioni meridionali. Numerosi individui della sottospecie nordafricana *B. r. cirtensis* sono stati osservati tra aprile e maggio a Pantelleria (TP), tra cui 2 coppie di cui è ritenuta probabile la nidificazione [A. Corso *et al.*, EBN].

Poiana calzata *Buteo lagopus* - 1 ind., 11/11/03-18/01/04, Medicina (BO) [G. Leoni *et al.*, EBN] - 1 ind., 7/2/04, Silea (TV) [P. Vacilotto, EBN] - 1 ind., 11/3/04, Preval (GO) [R. Peressin, EBN].

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* - 1 ind., 12/5/04 lago Salso (FG) [M. Marrese, M. Caldarella] - 1 ind., 15/6/04, Saline di Margherita di Savoia (FG) [F. Ciardiello *et al.*] - 1 ind., fine giugno, Saline di Margherita di Savoia (FG) [A. Merola *et al.*] - 1 ind., 7/7/04, Zaponeta (FG) [M. Marrese, L. De Lullo] - 1 ind., prima settimana di novembre, Siracusa [E. Mallia].

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga* - 1 ind., 7/1/04, Orbetello (GR) [G. Prola, EBN] - 1 ind., 11/1/04, Lago Salso (FG) [M. Caldarella, M. Marrese, EBN] - 1 ind., 17/1/04, Bocca d'Ombrone (GR),

[G. Anselmi *et al.*, COT] 1 ind., 19-29/01/04, Bozzole-Valmacca (AL) [C. Demicheli *et al.*, EBN] - 1 ind., 15/2/04, Orbetello (GR) [G. Condello *et al.*] - 1 ind., 29/2/2004, Oldenico (VC) [F. Carpegna *et al.*, EBN] - 1 ind., 15/3/04, Oasi Bentivoglio (BO) [P. Gallerani, EBN] - 1 ind., 9/10-28/11/04, Torrile (PR) [M. Ravasini, EBN] - 1 ind., 7/11/04, Valli di Mirandola (MO) [C. Giannella *et al.*, EBN] - 1 ind., 10-13/11/04, Genova-torrente Bisagno [R. Bontà *et al.*, EBN; Baghino 2005, Bollettino ROL] - 1 ind., 26/11/04, Gropello Cairoli/Zerbòld (PV) [M. Belardi, EBN].

Aquila minore *Hieraaetus pennatus* - Migrazione autunnale estremamente cospicua, con contingenti precedentemente mai rilevati in Italia (Premuda e Baghino 2004, R.I.O. 74: 103-115). Circa 500 ind. provenienti dalla Spagna e dalla Francia osservati in Liguria e successivamente in Toscana con direzione meridionale [L. Baghino, G. Premuda, EBN], con picco di 190 ind. ad Arenzano (GE) il 17/10/04 [M. Giorgini *et al.*, EBN]. 10 ind. sono stati osservati anche a Trento il 25/10/04 [K. Tabarelli de Fatis, EBN]. Osservazioni meno cospicue si sono avute in tutte le regioni meridionali e insulari anche durante il periodo invernale. Di rilievo l'osservazione di 16 ind. il 30/10/04 a Favignana (TP) [G. Prola, EBN] e di 42 ind. il 17/12/04 a Cozzo Pantano (SR) [A. Corso, EBN]. Circa 40-60 ind. hanno svernato in Sicilia centro-orientale [A. Corso] e 50 nel comprensorio occidentale agrigentino [S. Greci]. Individui isolati sono stati osservati svernare anche nel Delta del Po [M. Passarella *et al.*, EBN] e al Lago di Massaciucoli (LU) [D. Occhiato, EBN].

Sacro Falco cherrug - 1 ind., 3/1/04, Stornara (FG) [M. Marrese *et al.*, EBN] - 1 ind., 4/1/04, Lago Gorgo (SR) [S. Greci, EBN] - 1 ind., 27/4/04, Conero (AN) [M. Borioni *et al.*, EBN] - 1 ind., 3/11/04, Maccaresse (RM) [R. Gildi, EBN] - 1 ind., 6/11/04, Parco della Maremma (GR) [R. Nardi, EBN] - 1 ind., 26/11/04, Valle Peligna (AQ) [A. Antonucci, EBN].

Re di quaglie *Crex crex* - 1 ind., 2/1/04, San Donà di Piave (TV) [L. Panzarin, G. Sgorlon, EBN]. Svernante raro.

Schiribilla Porzana parva - 1 ind., 29/12/04, Lentini (CT) [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind., 17/11/04, Firenze [I. Romano, EBN]. Osservazioni in periodo non usuale.

Pavoncella gregaria *Vanellus gregarius* - 1 ind., 15/5/04, Crova (VC) [S. Prota, S. Torelli, EBN] - 1

ind., 27-30/10/04 Isola della Cona (GO) [S. Candotto *et al.*, EBN] - 1 ind., 9/10/04, Lardirago (PV) [G. Conca, D. Segagni, EBN].

Piviere orientale *Pluvialis fulva* - 1 ind., 20/9-6/10/04, Faro di Gorino (FE) [M. Passarella, A. Farioli, EBN].

Piro piro del Terek *Xenus cinereus* - 1 ind., 2/5/04, Foce del Crati (CS) [A. Giorgio, G. Viggiani, EBN] - 1 ind., 15/5-21/5/04, Ischitella (CE) [G. Albarella *et al.*, EBN] - 2 ind., 24-25/5/04, Saline di Siracusa (SR) [B. Doe, EBN] - 2 ind., fine agosto-inizio novembre/04, Saline di Priolo (SR) [A. Corso *et al.*, EBN].

Piro-piro pettorale *Calidris melanotos* - 1 ind., 25/8/04, Manzolino (MO) [F. Capitani *et al.*, EBN] - 1 ind., 27/8/04, Isola della Cona (GO) [S. Candotto, EBN].

Piovanello violetto *Calidris maritima* - 1 ind., 19/11/04, Faro di Gorino (FE) [R. Tinarelli, EBN].

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* - 2 ind., 14/3/04, Vecchiano (PI) [A. Quaglierini, EBN] - 1 ind., 23/5/04, Isola Della Cona (GO) [S. Candotto, D. Mattellone, EBN] - 1 ind., 24/5/04, Ceggia (VE) [G. Sgorlon, L. Boscain, EBN] - 1 ind., 6/7/04, Ischitella (CE) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 30/7-4/08/04, Ischitella (CE) [O. Janni, EBN] - 1 ind., 16/8/04, Ischitella (CE) [O. Janni, EBN].

Piro-piro fulvo *Tryngites subruficollis* - 1 ind., 24/5/04, Roncaro (PV) [E. Vigo, D. Segagni, EBN].

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* - 1 ind., 6-8/8/04, Ischitella (CE) [O. Janni *et al.*, EBN] - 1 ind., 21/9/04, Bentivoglio (BO) [D. Bonazzi, EBN] - 1 ind., 17-24/10/04, Vasche dell'Arnetta (VA) [A. Turri *et al.*, EBN] - 3 ind., 20/8/04, Saline di Comacchio (FE) [F. Capitani, EBN].

Stercorario maggiore *Stercorarius skua* - 1 ind., 11/12/04, foce del Garigliano (CE-LT) [O. Janni, EBN].

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* - 1 ind., 8/8/04, Lido di Venezia [L. Vio, EBN] - 1 ind., 1/9/04, Gallarate (VA) [G. Romagnoli, EBN].

Zafferano siberiano *Larus fuscus heuglini* - 7-8 ind., 10/1/04, Foce del Simeto (CT) [A. Corso *et al.*, EBN] - 1 ind., 29/1/04, Ravenna [M. Passarella, EBN].

Sottospecie non ancora innalzata a rango di specie dalla C.O.I.; osservazioni non valutate.

Gabbiano di Pallas *Larus ichthyaetus* - 1 ind., 11/1/04, Lentini (CT) [H. Larsson *et al.*, EBN] - 1 ind., 13/7/04, Ischitella (CE) [V. Cavaliere, EBN].

Gabbiano sghignazzante *Larus atricilla* - 1 ind., 18/1-29/2/04, 20/11/04-18/3/05 a Sanremo (IM) [M. Calvini *et al.*, EBN, M. Calvini 2005 Bollettino ROL 5-10, Quaderni di birdwatching 13] (cfr. anche C.O.I. reports n. 18-19).

Sterna codalunga *Sterna paradisaea* - 1 ind., 25/6/04, foce dei Regi Lagni (CE) [O. Janni, EBN].

Fratricello *Sterna albifrons* - 1 ind., 8/12/04, Saline di Margherita di Savoia (FG) [F. D'Erasmus *et al.*, EBN]. Osservazione in periodo inusuale.

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida* - 2 ind., 3/1/04, Lentini (CT) [A. Corso, EBN] - 1 ind., 6/1/04, Desenzano del Garda (BS) [S. Pirola, EBN] - 1 ind., 28/11-22/12/04 Peschiera (VR) [M. Sighele, R. Lercio, EBN].
Svernante raro.

Gazza marina *Alca torda* - 7 ind., 26/3/04, Ventimiglia (IM) [M. Calvini, EBN] - 1 ind., 1/12/04, Arenzano (GE) [C. Rapetti, EBN] - 1 ind., 12/12/04, Genova-Prà [G. Motta *et al.*, EBN].

Pulcinella di mare *Fratricula arctica* - 1 ind., 16/1/04, Bolgheri (LI) [O. Hunyady, EBN].

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* - 65 ind. in aprile-maggio 2004 a Pantelleria (TP); nidificazione accertata per 3 cpp. [A. Corso *et al.*, EBN] - 3 ind., 1/8/04, Linosa (AG) [G. Di Liddo, EBN].

Upupa *Upupa epops* - 1 ind., 19/12/04, Valle Vecchia di Caorle (VE) [L. Boscain, P. Vacilotto, EBN] - 1 ind., 13/12/04, Casse d'espansione dell'Enza (PR) [M. e E. Salvarani, EBN].
Svernante raro in Italia continentale.

Rondine rossiccia *Hirundo daurica* - 5 ind., 15/12/04 (alcune riosservate sino a gennaio 2005), Cozzo Pantano (SR) [A. Corso, EBN].
Osservazione in periodo inusuale.

Calandro maggiore *Anthus richardi* - 12 ind. osservati in Lazio a gennaio, 20 il 20/1/04 e 33 il 7/2/04 a Cagliari [Grussu e Biondi, Brit. Birds 97: 194-195], 15 ind. svernanti in Sicilia orientale [A. Corso *et al.*, EBN]. Inoltre: 11 ind., 28/3/04, torrente Parma (PR) [M. Mendi, M. Pedrelli, EBN] - 1 ind., 3/4/04, Varazze (SV) [M. Cadenelli *et al.*, EBN] - 7 ind., 4/4/04, Capo Murro di Porco (SR) [A. Corso, EBN] - 32 ind., 9/11/04, Cagliari e 5-6, 28/11/04, Golfo di Oristano [M. Grussu, EBN] - 2 ind., 25/12/04, Siracusa [A. Corso, EBN].

Pispola golarossa *Anthus cervinus* - 1 ind., 1/1/04, Pantano Cuba (SR) [G. Nuovo *et al.*, EBN] - 2 ind., 27/12/04, Pantano Cuba (SR) [A. Corso *et al.*, EBN]. Svernante raro.

Beccofrusone *Bombcilla garrulus* - Nell'inverno 2004-2005 un'invasione ha caratterizzato l'intero arco alpino, con osservazioni in tutte le regioni. Prima segnalazione di 2 ind. il 18/12/04 a Villa Vicentina (UD) [S. Candotto, A. Piazza, EBN]. I contingenti più cospicui sono stati osservati in Alto Adige con oltre 700 ind. conteggiati dal 22 al 24/1/05 [M. Azzolini *et al.*]. Sull'altopiano del Renon (BZ) presenza stabile di circa 300 ind., con la maggiore concentrazione rilevata a Collalbo in gennaio ed ultima osservazione il 7/5/05 presso Auna di Sotto con 2 ind. [M. Azzolini, H. Maier]. Rilevante anche l'osservazione di 300 ind. il 5/3/05 a Cossato (BI) [I. Manfredi, EBN].

Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola* - 1 ind., 27/5/04, Isolino (VB) [M. Bandini] - 1 ind., 15-17/12/04, Cozzo Pantano (SR) [A. Corso, EBN].

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus* - 1 ind., 28/11/04, Valle Mandriole (FE) [F. Trave, EBN] - 2 ind., 17/12/04, Cozzo Pantano (SR) [A. Corso, EBN]. Osservazioni in periodo inusuale.

Balia caucasica *Ficedula semitorquata* - 1 ind., 2/5/04, Pantelleria (TP) [A. Corso *et al.*, EBN].

Usignolo d'Africa *Cercotrichas galactotes* - 1 ind., 9/5/04, Ventotene (LT) [F. Spina].

Monachella del deserto *Oenanthe deserti* - 1 ind., 6/4/04, Ventotene (LT) [M. Brancaleoni, EBN].

Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina* - 2 ind., 20/3/04, Capo Murro di Porco (SR) [A. Ciaccio, EBN] - 4-6 ind., fine marzo-inizio aprile/04, Capo Murro di Porco (SR) [A. Corso] - 1 ind., 4/4/04, Campo Calabro (RC) [A. Scuderi, EBN] - 1 ind., 10/9/04, Marettimo (TP) [U. Fusini, G. Leoni, EBN].

Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* - 1 ind., 29/5/04, Isolino (VB) [M. Bandini] - 1 ind., 11-25/6/04, Valle Vecchia di Caorle (VE) [L. Panzarin, D. Cester, EBN].

Crociere *Loxia curvirostra* - 10 ind., 29/8/04, Salina (ME) [R. Gildi, EBN] - 20 ind., 27-28/8/04, Marettimo (TP) [G. e P. Chiatante]. Osservazioni al di fuori dell'areale noto.

Organetto *Carduelis flammea* - 3 ind., 10/11/04, valle dell'Anapo (SR) [A. Corso *et al.*, EBN]. Osservazione al di fuori dell'areale noto.

Trombettiere *Bucanetes githagineus* - 1 ind., 1/8/04, Linosa (AG) [G. Di Liddo, EBN].

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos* - 8 ind., 16/11-22/12/04 Macchia Lucchese (LU) [D. Occhiatto *et al.*, EBN] - 3 ind., 11/1-7/3/04, Carrù (CN) [B. Caula *et al.*, EBN] - 1 ind., 25/11/04, Bassone (CO) [M. Brambilla, EBN].

Ortolano grigio *Emberiza caesia* - 1 ind., 10/5/04, Ventotene (LT) [F. Spina].

Zigolo minore *Emberiza pusilla* - 1 ind., 15/2/04, Lonate Pozzolo (VA) [C. dell'Acqua, A. Turri, EBN].

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* - 1 ind., 6/1/04, lago di Pusiano (LC) [A. Nava, EBN] - 1 ind., 31/1/04, Pian di Spagna (CO-SO) [A. Nava *et al.*, EBN] - 1 ind., 25/11/05, S. Giorgio di Bosco Chiesa-nuova (VR) [M. D'Offria, AsFaVe] - 2 ind., 12/12/04, Macchia Lucchese (LU) [A. Chiusi, EBN] - 1 ind., 30/12/04, Siffiano (BZ) [W. Nicolussi, EBN].

'c/o Redazione Avocetta, Dipartimento di Biologia Animale, Piazza Botta 9, I-27100 Pavia (ugomellone@libero.it); *²*Associazione EBN Italia, Via Lungolori 5a, I-37127 Verona (maudoc@ebnitalia.it); *³*Centro Ornitologico Toscano, Casella Postale 726, I-57100 Livorno (arcamone@libero.it)

Recensioni

Si invitano i lettori a sottoporre recensioni di libri alla Redazione.

Del Hoyo J, Elliott A, Christie D (eds) 2003. *Handbook of the Birds of the World. Volume 8, Broadbills to Tapaculos*. Lynx Edicion, Barcelona.

Del Hoyo J, Elliott A, Christie D (eds) 2004. *Handbook of the Birds of the World. Volume 9, Cotingas to Pipits and Wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona.

Questi sono i primi due volumi dell'HBW dedicati ai passeriformi. In ciascun volume vengono esaminate nove famiglie di uccelli: Eurylaimidae, Phyleppitidae, Pittidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, Conopogidae, Rhinocryptidae nel Volume 8; Cotingidae, Pipridae, Tyrannidae, Acanthisittidae, Atrichornithidae, Menuridae, Alaudidae, Hirundinidae e Motacillidae nel volume 9. In altri termini, vengono trattate tutte le famiglie dei suboscini (Eurylaimi, Furnarii, Tyranni, Acanthisittae e Menurae) nonché tre famiglie (allodole, rondini e ballerine) del grande sottordine degli oscini.

La prefazione al volume 8 è una storia della classificazione degli uccelli, a firma di Murray Bruce. Pur essendo limitata al solo ordine dei passeriformi, questa review, per completezza dei dati presentati, fornisce sicuramente un quadro esaustivo dei metodi e delle tecniche adottate dal 1700 nella classificazione dell'intera classe Aves. A partire dal Systema Naturae di Linneo, l'autore riconosce tre grandi momenti della classificazione ornitologica: un periodo basato su un approccio tipologico (1758-1850), uno intermedio centrato, in prevalenza, su un approccio evolutivo ed adattazionista (1867-1934) e un terzo ed ultimo periodo imperniato su un approccio filogenetico e biomolecolare (dal 1951). In questi ultimi anni, dopo la stimolante pubblicazione di Sibley e Ahlquist del 1985, molti dei problemi incontrati nella classificazione naturale (filogenetica) dei passeriformi sono stati superati, ma altri sono tuttora irrisolti. In termini generali, per esempio, se i due taxa dei suboscini e degli oscini rappresentano due gruppi ben distinti di passeriformi (in primo luogo discriminati, come noto, sulla base di una diversa struttura della siringe) i confini tra le famiglie al loro interno sono molto meno riconoscibili ed individuabili. La

famiglia Rhinocryptidae, per fare un esempio, potrebbe non essere monofiletica e, secondo alcuni, annovera specie in realtà appartenenti ad un'altra famiglia (non trattata, come tale, dall'HBW).

La prefazione al volume 9 è di Richard Bank che, partendo dal Codice Internazionale della Nomenclatura Zoologica e sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Internazionale, ci introduce al mondo della nomenclatura ornitologica e ci dimostra come dare un nome alle specie non sia affatto un compito semplice. Un problema di non agevole soluzione, per esempio, è quello di inquadrare le entità nuove nel giusto livello tassonomico: dal 1920 al 1990, per esempio, sono state descritte 900 specie nuove, ma solo il 30% ha retto ad un successivo esame, le altre sono state ricollocate al livello di sottospecie nuove. Tra i vari dati presentati, mi piace sottolineare quello relativo agli ornitologi che hanno correttamente identificato e descritto il maggior numero di specie: su tutti, naturalmente, primeggia Linneo (che ha dato il nome a 714 specie), seguito da grandi sistematici dell'ottocento quali Sclater, Vieillot e Gould. Tra gli altri c'è anche un italiano illustre; si tratta di Tommaso Salvadori, che ha correttamente descritto ben 136 specie di uccelli!

In generale, in entrambi i volumi, l'avifauna neotropica, del Centro-Sud America, è certamente quella più rappresentata. Le specie di questa Regione sono ancora poco studiate e i testi sono stati quindi potenziati ad arte, nel tentativo di fornire al lettore un quadro aggiornato delle conoscenze raggiunte. Particolarmente importati sono i dati relativi allo status e alla conservazione di questa avifauna. A tale proposito, è sufficiente un rapido esame delle cartine distributive per notare come molte specie presentino distribuzioni ristrette (si vedano i già citati Rhinocryptidae, per esempio), una caratteristica che, in seguito al sempre più devastante intervento dell'uomo sull'ambiente neotropico, le espone ad un elevato rischio di estinzione.

Tra le famiglie che meritano forse una maggior attenzione voglio citare i Furnaridi sud americani, che sono noti per la costruzione di nidi chiusi di fango (miscelato con fibre vegetali e/o sterco) estremamente

solidi e robusti, assimilabili a dei forni di terracotta, da cui il nome. In realtà la famiglia, nel suo complesso, si caratterizza per una eccezionale diversità nella forma, struttura e dimensione dei nidi perché, accanto alle specie che costruiscono i “forni” (tutte appartenenti al genere *Furnarius*), ci sono specie che realizzano grandi nidi di fibre vegetali a forma di coppa o sfera, specie che occupano cavità arboree o tane sotterranee, e anche specie che occupano i nidi di altri uccelli. Una seconda famiglia degna di menzione è quella delle pitte, uccelli terricoli che vivono nelle foreste tropicali di Africa, Asia ed Australia che si impongono per i colori vivaci ed insolitamente sgargianti del piumaggio (si vedano le foto della *Pitta granatina* e della *P. baudi* a pagina 128 e 129, Volume 8).

Impareggiabile, come sempre, la parte iconografica. Le immagini fotografiche sono di eccellente qualità e permettono di apprezzare la bellezza degli animali ritratti e le peculiarità dell'habitat; non di rado, inoltre, questa documentazione assume anche un rilevante significato comportamentale o ecologico. La fotografia del *Manacus caldei* al nido (Volume 9, pagina 135), per esempio, grazie alla impressionante nitidezza dei dettagli, permette di cogliere sia i particolari costitutivi delle piume (per alcune si possono agevolmente contare le singole barbe), sia la presenza delle minute zanzare che spesso tormentano gli individui a cova (cercano le zone di pelle nuda intorno al becco per poter pungere). La fotografia del combattimento tra ballerine bianche (volume 9, pagina 709), con un individuo atterrato sulla schiena in balza dell'altro, sottoli-

nea meglio di qualsiasi testo quanto questi animali possano essere aggressivi in periodo riproduttivo. Le tavole a colori (81 nel volume 8 e 78 nel volume 9), d'altra parte, sono essenziali per il riconoscimento delle singole entità, soprattutto nel caso di specie politipiche che presentano sottospecie cromaticamente molto simili (si vedano, per esempio, le tavole relative ai generi *Eremophila*, *Galerida*, *Motacilla* e *Anthus*, volume 9) e sono anche molto utili per apprezzare l'esito di fenomeni evolutivi complessi. Se vengono prese in considerazione le tavole dei dendrocolaptidi (volume 8), per esempio, il fenomeno della convergenza con i nostri rampichini e, più in generale, con i nostri picchi, è immediatamente apprezzabile. Le stesse tavole, d'altra parte, documentano quanto l'aspetto delle specie di questo gruppo sia anche il risultato di uno straordinario adattamento alla nicchia trofica: i dendrocolaptidi presentano infatti becchi di tutte le dimensioni e di tutte le forme!

Imponente la bibliografia di riferimento, con circa 4000 voci nel volume 8 e 6000 nel volume 9. Tra gli italiani citati è il caso di ricordare le numerose pubblicazioni di Nicola Saino (quasi una trentina, tutte su riviste internazionali!) e di Andrea Pilastro sulla rondine, nonché quelle di Emilio Baldaccini sul topino e di Fernando Spina sui flussi migratori.

Per saperne di più scrivere a lynx@hbw.com o visitare il sito <http://www.hbw.com>.

Antonio Rolando (antonio.rolando@unito.it)

Ornitologia italiana su riviste straniere

A cura di *Alberto Sorace*¹

La rubrica segnalerà i lavori ornitologici che riguardano il territorio italiano pubblicati su riviste straniere. Si invitano gli ornitologi italiani a collaborare comunicando al curatore della rubrica i lavori, propri o di altri autori, pubblicati su riviste straniere in particolare su riviste ornitologiche a scarsa diffusione o su riviste non ornitologiche. Questo numero della rubrica riporta gli articoli pubblicati nel 2004.

Acquarone C, Cucco M, Malacarne G, Silvano F 2004. Temporary shift of body size in hooded crows

Corvus corone cornix of NW Italy. *Folia Zoologica* 53: 379-384.

Adamo MC, Puglisi L, Baldaccini NE 2004. Factors affecting Bittern *Botaurus stellaris* distribution in a Mediterranean wetland. *Bird Conservation International* 14: 153-164.

Agostini N 2004. Additional observations of age-dependent migration behaviour in western honey buzzards *Pernis apivorus*. *Journal of Avian Biology* 35: 469-470.

- Agostini N, Coleiro C, Panuccio M 2004. Analysis of the autumn migration of juvenile honey buzzards (*Pernis apivorus*) across the central Mediterranean. *Journal of Raptor Research* 38: 283-286.
- Agostini N, Panuccio M, Massa B 2004. Flight behaviour of Honey Buzzards (*Pernis apivorus*) during spring migration over the sea. *Buteo*: 14: 3-10.
- Agostini N, Premuda G, Mellone U, Panuccio M, Logozzo D, Bassi E, Cocchi L 2004. Crossing the sea en route to Africa: autumn migration of some Accipitriformes over two central Mediterranean islands. *Ring* 26: 71-78.
- Battisti C, Gippoliti S 2004. Conservation in the urban-countryside interface: a cautionary note from Italy. *Conservation Biology* 18: 581-583.
- Brambilla M, Rubolini D 2004. Water Rail *Rallus aquaticus* breeding density and habitat preferences in northern Italy. *Ardea* 92: 11-17.
- Brambilla M, Rubolini D, Guidali F 2004. Rock climbing and Raven *Corvus corax* occurrence depress breeding success of cliff-nesting peregrines *Falco peregrinus*. *Ardeola* 51: 425-430.
- Corso A, Cardelli C 2004. The migration of Pallid Harrier across the central Mediterranean with particular reference to the strait of Messina. *British Birds* 97: 238-246.
- Corso A, Monterosso G 2004. Further comments on dark Hobbies in southern Italy. *British Birds* 97: 411-414.
- De Leo GA, Focardi S, Gatto M, Cattadori IM 2004. The decline of the grey partridge in Europe: comparing demographics in traditional and modern agricultural landscapes. *Ecological Modelling* 177: 313-335.
- Gagliardo A, Odetti F, Ioalè P, Pecchia T, Vallortigara G 2005. Functional asymmetry of left and right avian piriform cortex in homing pigeons' navigation. *European Journal of Neuroscience* 22: 189-194.
- Galeotti P, Rubolini D 2004. The niche variation hypothesis and the evolution of colour polymorphism in birds: a comparative study of owls, nightjars and raptors. *Biological Journal of the Linnean Society* 82: 237-248.
- Grussu M, Biondi M 2004. Record numbers of wintering Richard's Pipits in the western palearctic. *British Birds* 97: 194-195.
- Gustin M, Sorace A 2004. Conero Promontory in central Italy, an important spring bridge for eastern migrant raptors. *British Birds* 97: 403-406.
- Kvist L, Viiri K, Dias PC, Rytönen S, Orell M 2004. Glacial history and colonization of Europe by the blue tit *Parus caeruleus*. *Journal of Avian Biology* 35: 352-359.
- Laiolo P, Dondero F, Ciliento E, Rolando A 2004. Consequences of pastoral abandonment for the structure and diversity of the alpine avifauna. *Journal of Applied Ecology* 41: 294-304.
- Laiolo P, Rolando A, Delestrade A, De Sanctis A 2004. Vocalizations and morphology: interpreting the divergence among populations of Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* and Alpine Cough *P. graculus*. *Bird Study* 51: 248-255.
- Laiolo P, Rolando A, Valsania V 2004. Responses of birds to the natural re-establishment of wilderness in montane beechwoods of North-western Italy. *Acta Oecologica* 25: 129-136.
- Lind J, Gustin M, Sorace A 2004. Compensatory bodily changes during moult in Tree Sparrows *Passer montanus* in Italy. *Ornis Fennica* 81: 75-83.
- Magnani A 2004. Partial moult involving all the greater coverts in first-year Nightingales, *Luscinia megarhynchos megarhynchos*, in Italy. *Ringing & Migration* 22: 59-60.
- Møller AP, de Lope F, Saino N 2004. Parasitism, immunity, and arrival date in a migratory bird, the Barn Swallow. *Ecology* 85: 206-219.
- Møller AP, Martinelli R, Saino N 2004. Genetic variation in infestation with a directly transmitted ectoparasite. *Journal of Evolutionary Biology* 17: 41-47.
- Møller AP, Saino N 2004. Immune response and survival. *Oikos* 104: 299-304.
- Ninni P, de Lope F, Saino N, Haussy C, Møller AP 2004. Antioxidants and condition-dependence of arrival date in a migratory passerine. *Oikos* 105: 55-64.

Pandolfi M, Gaibani G, Tanferna A 2004. Depicts the number of breeding pairs reliably the status of Peregrine Falcon *Falco peregrinus*? *Ardea* 92: 247-251.

Panuccio M, Agostini N, Massa B 2004. Spring raptor migration at Ustica, southern Italy. *British Birds* 97: 400-403.

Puglisi L, Adamo C 2004. Discrimination of individual voices in male Great Bitterns (*Botaurus stellaris*) in Italy. *Auk* 121: 541-547.

Rubolini D, Spina F, Saino N 2004. Protandry and sexual dimorphism in trans-Saharan migratory birds. *Behavioral Ecology* 15: 592-601.

Saino N, Romano M, Ambrosini R, Ferrari RP, Møller AP 2004. Timing of reproduction and egg quality covary with temperature in the insectivorous Barn Swallow, *Hirundo rustica*. *Functional Ecology* 18: 50-57.

Saino N, Szép T, Romano M, Rubolini D, Spina F, Møller AP 2004. Ecological conditions during winter predict arrival date at the breeding quarters in a trans-Saharan migratory bird. *Ecology Letters* 7: 21-25.

Saino N, Szep T, Ambrosini R, Romano M, Moller AP 2004. Ecological conditions during winter affect sexual selection and breeding in a migratory bird. *Proceedings: Biological Sciences* 271: 681-686.

Sergio F, Marchesi L, Pedrini P 2004. Integrating individual habitat choices and regional distribution of a biodiversity indicator and top predator. *Journal of Biogeography* 31: 619-628.

Sergio F, Marchesi L, Pedrini P, Ferrer M, Penteriani V 2004. Electrocutation alters the distribution and density of a top predator, the eagle owl *Bubo bubo*. *Journal of Applied Ecology* 41: 836-845.

Sergio F, Rizzolli F, Marchesi L, Pedrini P 2004. The importance of interspecific interactions for breeding-site selection: peregrine falcons seek proximity to raven nests. *Ecography* 27: 818-826.

Sorace A, Petrassi F, Consiglio C 2004. Long-distance relocation of nestboxes reduces nest predation by Pine Marten *Martes martes*. *Bird Study* 51: 119-124.

1Via Roberto Crippa 60, D/8, I-00125 Roma (Acilia) (sorace@fastwebnet.it)